


Sluta lida

av biverkningarna från
felinriktade fötter



Upptäck hur **HyProCure®**
kan hjälpa dig att få tillbaka
din livskvalitet!

Återupptäck livet med **HyProCure®**

HyProCure®-ingreppet kan drastiskt minska eller till och med eliminera din smärta samtidigt som livskvaliteten förbättras. Efter ingreppet:

- Ska du kunna stödja försiktigt på foten
- Svullnad eller blåmärken är vanligt de första dagarna
- Under en tillfällig period har du en onaturlig gång tills fötterna anpassar sig till sin korrigerade position
- Efter det första året har din kropp vanligtvis anpassat sig helt

Läs mer på **HyProCure.info**



Låt inte dina
fötter sakta
ned dig!




Symptom och effekter

Vanliga symptom hos både barn och vuxna inkluderar:


- Ökande smärtor/benhinneinflammationer
- Överpronation/hyperpronation
- Liktornar/hammartår
- Hälsmärta/hälsporrar – "plantar fasciit"
- Sträckning i senor och ligament
- Knä-, höft- och ryggsmärta

Det här tillståndet går inte över av sig självt. Patienterna växer inte ur det, och tillståndet kan inte behandlas ordentligt med träning eller sjukgymnastik. Det är ett anatomiskt inre problem och endast en inre lösning kan återställa korrekt inriktning.

Onormalt



HyProCured®



De sekundära effekterna av talotarsal förskjutning inkluderar onormal påfrestning och onormalt tryck på leder, ligament och ben i hela kroppen.

När de sekundära tillstånden behandlas utan att korrekt ta itu med den partiella talotarsala förskjutningen kommer behandlingsresultaten att vara tillfälliga. Symptomen kommer sannolikt att återkomma eller flyttas till en annan del av kroppen.

**Maskera inte bara symptomen.
Rätta till den bakomliggande
orsaken.**



Problemet

En felaktigt inriktad fot kan påverka hela kroppen. Detta underbehandlade men vanliga tillstånd ses hos människor i alla åldrar över hela världen.

Talotarsal förskjutning, eller partiell talotarsal förskjutning, inträffar när vristbenet förskjuts från sin normala position och från dess kontaktpunkter på bakfotsbenen.

Detta skapar en onormal inåtgående rotation hos vristbenet och en utåtgående rotation av foten. En obalans i krafter och viktfordelning blir resultatet inuti foten och resten av kroppen medan du står och med varje steg du tar.

Detta är den vanligaste orsaken inte bara till felinriktade fötter utan även till liktornar, hälsmärta, hammartår och en lång lista av andra fot- och vristdeformationer. En felinriktad fot/vrist kan ha negativ inverkan på knän, höfter och rygg eftersom foten är grunden för kroppen.

Före

Partiell talotarsal förskjutning



Lösningen



HyProCure® är en titanstent som placeras genom ett minimalt invasivt ingrepp, vanligtvis under halvmedveten/lokal bedövning, i ett naturligt förekommande utrymme mellan vrist- och hälbenen. Den riktar om och stabiliserar omedelbart bakfoten vilket möjliggör normalt rörelseområde. Den övergripande balansen och inriktningen hos foten/visten kommer att förbättras och fotvalvet kan verka mer normalt.

HyProCure® korrigerar denna deformation vid dess grundorsak. Det är ett evidensbaserat ingrepp som har utförts på tusentals patienter i alla åldrar. När det är indikerat används det av fot- och vristkirurger över hela världen.

Vanligtvis kan de flesta **HyProCured®**-patienter gå normalt igen efter några veckor. Ben, senor och ligament i hela foten och resten av kroppen kommer att anpassa sig till den korrigerade positionen under de följande månaderna.

Efter

Internt stabiliserad/korrigerad



För mer information om **HyProCure®**, besök HyProCure.info